

TÁJÉKOZTATÓ

Műtetre kerülő betegek érzéstelenítéséről

Kedves Betegünk!

A fájdalmas vizsgálatokat, műtéteket érzéstelenítés alatt végzik. Az altató orvos feladata, hogy a műtét során Ön ne érezzen fájdalmat és fenntartsa szervezete normális működését. Együttműködése a sebésszel szintén az Ön biztonságát szolgálja.

A következőkben röviden ismertetjük az érzéstelenítés különböző módjait.

Altatás (általános érzéstelenítés)

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és eszméletlenséggel társul. Az altatás kezdetén fokozatosan alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig fenntartunk.

Egy „előkészítő” injekció vagy tablettát után, az altatást általában vénás injekcióval kezdjük. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót ismételtük, vagy altató gázokat adunk arcmaszk, illetve légcsőbe vezetett tubus segítségével.

Ez utóbbit akkor végezzük, ha Ön már alszik. Ezzel a módszerrel közvetlenül tüdejébe juttatjuk az oxigén és altatógáz keverékét.

A módszer rendkívül biztonságos, mert így tökéletesen tudjuk biztosítani a lélegeztetést, hányás esetén tüdeje védve van a félrenyeléstől. Ezt a módszert alkalmazva izomlazítókat is adhatunk, ami a sebész számára biztosít jobb feltételeket.

Helyi érzéstelenítés

A fájdalommentesség a test bizonyos, körülírt területeire, vagy az operáció helyére korlátozódik, eszméletlenséggel nem párosul.

A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza.

Gerincközeli (psinalis vagy epiduralis) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes.

Az érzéstelenítés módjának kiválasztása

Mindegyik érzéstelenítési módszernek vannak előnyei és hátrányai is. Mi mindig azt javasoljuk Önnek, ami a legjobban megfelel a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából.

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos súlyos szövődmények rossz általános állapotú betegnél is rendkívül ritkák. A modern altatás (általános érzéstelenítés), mely korszerű gyógyszerekkel, lélegeztetőgéppel is felszerelt altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk.

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG stb.) folyamatosan ellenőrizzük. A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az idegsérülésük igen ritkák.

Kérjük műtét előtt saját érdekében, ügyeljen a következőkre!

Hat órával a műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon!


Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el! Ha van, vegye le ékszereit, mossa le a körömlakkot, szemfestéket!

Kérdezzen!

Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtt találkozáskor!

Kérjük figyelmesen, töltsse ki a következő adatlapot!

A szövődmények megelőzése, korai elhárítása érdekében, valamint, hogy az Ön számára legmegfelelőbb érzéstelenítési eljárást kiválaszthassuk, fontos az általános állapotára vonatkozó adatok ismerete. A kérdések nagy számát az indokolja, hogy a ritka, és a nem súlyos szövődményeket is el szeretnénk kerülni. Az „egyéb” rovatban adjon meg minden Ön szerint fontos, a kérdésekben nem szereplő információt.



**Beleegyző nyilatkozat
érzéstelenítés, altatás, intenzív kezelésbe**

A tervezett műtétemhez szükséges érzéstelenítésbe, altatásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe beleegyezem. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam. Lehetőségem volt arra, hogy elolvassam és az érzéstelenítést végző orvossal megbeszéljem. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Hozzájárulok, hogy a rajtam tervezett műtétet/vizsgálatot az altatóorvos szerint megfelelő érzéstelenítési eljárás segítségével végezzék el, szükség esetén vért vagy vérkészítményt adjanak, az eljárás közben szükségessé váló eszközös vizsgálatokat, beavatkozásokat elvégezzék, az érzéstelenítést a beavatkozás közben esetlegesen felmerülő új szakmai igényeknek vagy problémáknak megfelelően módosítsák. Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 órában önállóan nem közlekedhetek, ez idő alatt folyadékot csak orvosi engedéllyel fogyaszthatok, altatót nyugtató fájdalomcsillapító szert csak orvosi utasításra kaphatok.

Az írásos tájékoztatón kívül személyre szabott tájékoztatást kaptam a felvilágosítást adó orvostól.


Dátum:

.....
beteg/törvényes képviselő* aláírása

.....
anaesth. orvos aláírása

(aláírni csak az aneszteziológiai vizsgálat után kell!)

**Kiskorú vagy ítélőképességében korlátozott beteg esetében.*



Utasítások az altatott betegek kórházból való távozása utáni időszakra

Kérjük, hogy amennyiben műtéti érzéstelenítésre kerül sor, saját és mások biztonsága érdekében a kórházból való távozását követő első 24 órában tartsa be az alábbi utasításokat!

Altatás után csak felelős felnőtt kísérelével menjen haza!

Géppel, balesetveszélyes háztartási készülékkel ne dolgozzon!

Kerüljön minden, egyensúlyérzéklet kívánó helyet, helyzetet, eszközt. Hivatalos iratot ne írjon alá, szerződést ne kössön! Gépjárművet ne vezessen! Szeszes italt ne fogyasszon, ne dohányozzék!